


Gebruikershandleiding ter bestrijding van bloedmijten

Dutchy's® bestrijden bloedmijten bij volièrevogels, kippen, duiven en reptielen

Dutchy's® van Refona kunnen uitgezet worden ter bestrijding van bloedmijten (*Dermanyssus gallinae*) bij vogels en reptielenbloedmijt (*Ophionyssus natricis*) bij reptielen. Voor elke diersoort (volièrevogels, kippen, duiven, reptielen) is een aparte gebruikshandleiding die te downloaden is van de website www.refona.nl. Hier vindt u informatie over de dosering, locatie van plaatsen, vernieuwen van de patronen en de minimale en maximale temperaturen voor de Dutchy's®. Volg nauwkeurig de aanwijzingen van deze gebruikershandleiding op, zodat de bestrijding zal slagen.

Bevestigen van de Mite Booster® houder

Plaats de Mite Booster® houder op een geschikte plaats in het hok. De houder moet in horizontale positie worden aangebracht met de afgeplatte zijde richting de achtergrond.



U kunt ervoor kiezen de houder vast te maken met de aan de houder bevestigde strips (foto links) of u kunt de houder vastmaken met behulp van een schroefje. Op de foto rechtsonder is de houder incorrect (ondersteboven) bevestigd.

Schuif het Mite Booster® patroon met daarin de Dutchy's® in de houder. Het gaatje waar de roofmijten uit zullen lopen dient rechtsboven te zitten.

Chemische middelen

Wanneer er in de periode voor het uitzetten van Dutchy's® chemische middelen zijn toegepast, is het mogelijk dat de roofmijten hier last van ondervinden. Voordat u de roofmijten uitzet, dient u minimaal 6 weken geen gebruik te hebben gemaakt van bestrijdingsmiddelen. Schoonmaakmiddelen mogen in deze periode wel gebruikt worden.

Tijdens het gebruik van Dutchy's® kunt u geen gebruik maken van chemische middelen of natuurlijke sprays in het verblijf van uw dieren. Deze middelen hebben namelijk ook een effect op de roofmijten, waardoor zij hun werk niet kunnen doen.

Wat kunt u verwachten?

Wanneer u begint met de bestrijding van bloedmijten met behulp van Dutchy's® is het mogelijk dat u een plotselinge toename van de schadelijke mijten waarneemt. Ook kunt u de bloedmijten tegenkomen op plaatsen waar u ze gewoonlijk niet ziet. Dit betekent dat de roofmijten hen uit hun schuilplaatsen hebben verjaagd. Na enkele weken zullen de roofmijten het van de schadelijke mijten hebben gewonnen. Als er na 3 weken nog geen verbetering optreedt, is het zinvol om nogmaals Dutchy's® te bestellen en uit te zetten. Het kan best zo zijn dat de plaag groter was dan u had ingeschat.

In principe kunnen Dutchy's® het probleem altijd oplossen, als ze daar maar de tijd voor krijgen en met voldoende aanwezig zijn.