

## **B. BIJSLUITER**

**BIJSLUITER****Drontal Dog Flavour, tabletten voor honden****1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND**Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Bayer SA-NV  
 J.E. Mommaertslaan 14  
 B-1831 Diegem (Machelen)

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH  
 Projensdorfer Str. 324  
 D-24106 Kiel  
 Duitsland

**2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL****Drontal Dog Flavour, tabletten voor honden****3. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDD(E)L(EN)**

Per tablet:

**Werkzame bestanddelen:**

Pyrantelemonaat	144 mg
Febantel	150 mg
Praziquantel	50 mg.

**Hulpstoffen:**

Maïszetmeel – Lactose – Microkristallijne cellulose – Magnesiumstearaat – Natriumlaurylsulfaat – Hooggedisperseerd siliciumdioxide – Polyvidone – Artificiële 'Beef flavour' q.s.p. tableta compr. una.

**4. INDICATIES**

Rondworm- en lintwormmiddel voor honden.

- Voor de behandeling van menginfestaties van rondwormen en lintwormen veroorzaakt door:

Spectrum	Wormspecies
Spoelwormen	<i>Toxocara canis</i> <i>Toxascaris leonina</i>
Lintwormen	<i>Echinococcus granulosus</i> <i>Echinococcus multilocularis</i> <i>Dipylidium caninum</i> <i>Taenia</i> spp. <i>Multiceps multiceps</i> <i>Mesocestoides</i> spp.

Haakwormen	<i>Uncinaria stenocephala</i> <i>Ancylostoma caninum</i>
Zweepwormen	<i>Trichuris vulpis</i>

- Als hulp voor de controle op de protozoa *Giardia*

## 5. CONTRA-INDICATIES

Geen

## 6. BIJWERKINGEN

In zeer uitzonderlijke gevallen kunnen lichte spijsverteringsstoornissen van voorbijgaande aard (zoals bvb. braken of diarree) optreden.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

## 7. DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Hond.

## 8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG

### DOSERING

Eén tablet per 10 kg lichaamsgewicht. Dit komt overeen met 15 mg febantel, 14,4 mg pyrantel-embonaat en 5 mg praziquantel per kg lichaamsgewicht.

### WIJZE VAN TOEDIENING

De tabletten kunnen op één van de volgende manieren worden toegediend:

- rechtstreeks achter op de tong aanbrenen en laten inslikken;
- verpulveren en met het voedsel mengen;
- toedienen in een vleesballetje.

Dieetmaatregelen zijn niet nodig.

### BEHANDELINGSDUUR

Voor de behandeling van menginfestaties van rondwormen en lintwormen: éénmalige toediening.

Voor de behandeling van infestaties van *Giardia* spp.: toediening op 3 opeenvolgende dagen.

Om de kans op herbesmetting met *Giardia* te verminderen, wordt het aanbevolen om ook de omgeving van de hond grondig te reinigen en de hond te desinfecteren of op een andere plaats over te brengen, in het bijzonder in kennels.

In het bijzonder onder omstandigheden waar de infestatiedruk hoog is, kan de eliminatie van *Giardia* spp. bij individuele honden onvolledig zijn, zodat er een mogelijk risico op besmetting bij de mens blijft bestaan.

Om deze reden dient de hond opnieuw onderzocht te worden en op basis van de resultaten dient, indien nodig, een herbehandeling gegeven te worden, overeenkomstig het advies van de dierenarts.

## 9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

-

## 10. WACHTTERMIJN(EN)

Niet van toepassing.

## 11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP:

De uiterste gebruiksdatum verwijst naar de laatste dag van de maand.

Geen speciale voorzorgen voor de bewaring van dit diergeneesmiddel.

## 12. SPECIALE WAARSCHUWING(EN)

### **Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren**

Vlooiën zijn tussengastheer en infectiebron voor een *Dipylidium*besmetting. Om herbesmetting te vermijden, moeten de vlooiën zowel op het dier als in de omgeving gelijktijdig bestreden worden met een werkzaam insecticide.

### **Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg**

De veiligheid van Drontal Dog flavour tijdens het eerste en het tweede gedeelte van de dracht werd niet onderzocht. Om deze reden wordt het gebruik bij drachtige honden gedurende de eerste 40 dagen van de dracht niet aanbevolen. De éénmalige behandeling gedurende het derde gedeelte van de dracht en gedurende lactatie werd aangetoond veilig te zijn voor zowel de teef als haar nakomelingen. Drontal Dog flavour voor de 3 dagen behandeling tegen *Giardia* spp. infestaties gedurende het derde gedeelte van de dracht uitsluitend gebruiken overeenkomstig de risico-baten beoordeling door een dierenarts.

### **Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie**

Niet gelijktijdig toedienen met een ander wormmiddel dat als werkzame stof piperazine bevat.

### **Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)**

Na toediening van meer dan 5 maal de voorgeschreven therapeutische dosis kunnen verminderde eetlust, braken en voorbijgaande diarree voorkomen.

## 13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikt product of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

## 14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

April 2016.

## **15. OVERIGE INFORMATIE**

BE-V164604.  
Vrije aflevering.