

NEMAFENCE® PHASMA

GEBRUIKSAANWIJZING

Werking

- *Phasmarhabditis californica*
- Parasitair aaltje
- Bevat een insectendodende symbiotische bacterie
- De symbionten doden de gastheer binnen 24 tot 48 uur
- De aaltjes vermeerderen zich in het kadaver en nieuwe infectieuze juveniele aaltjes verlaten de gastheer op zoek naar nieuwe plaaginsecten
- Geen nevenwerking op biologische bestrijders

Plagen

- Naaktslak
- Kleine huisjesslakken (die in het substraat leven)

Gewassen

- Aardbei
- Openbaar groen

Bewaring

- Verwijder bij ontvangst meteen de buitenverpakking en gebruik onmiddellijk
- Indien nodig, bewaar op een donkere plaats bij 2-6°C (35-43°F). NIET INVRIEZEN!
- Zorg voor een goede luchtcirculatie rond iedere tray
- Bewaar geen geopende verpakkingen, verdund of gemengd product

Dosering

	Preventief	Laag curatief	Hoog curatief
Gebruik	Besproeiing	Besproeiing	Besproeiing
Dosering (ind./m²)	50.000	100.000	300.000
Suspensie (L/m²)	1	1	1
Behandelingsfrequentie	3x	3x	3x
Behandelingsinterval	2-4 weken	2-6 weken	-

Opmerking: Hoewel de toepassing normaalgezien gebeurt wanneer er reeds slakken aanwezig zijn, kan het in sommige gevallen aangewezen zijn een preventieve behandeling op te starten tijdens risicoperiodes (bij regenweer) of bij gevoelige gewassen zoals sla. In dat geval wordt de oplossing vooral op de randen van de gewaszone gespreid om zo een fysieke barrière te creëren die het gewas beschermt tegen mogelijke invallen van slakken uit de omgeving. Eenmaal in de grond blijven de nematoden werkzaam tot 6 weken na toepassing.

Toepassing

Bereiding

Gebruik steeds de volledige inhoud van de verpakking.

- Vul de spuitank gedeeltelijk met zuiver water op kamertemperatuur.
- Open de verpakking voorzichtig en doe de inhoud in een emmer water. Los het product al roerend op. Spoel de verpakking na.
- Vul de spuitank tot aan het gewenste niveau. Gebruik meteen de juiste dosis.

Toepassingsmethode & Gebruiksvoorwaarden

- Om verstoppingen tijdens het sproeien te vermijden, verwijder alle filters van 50 mesh of kleiner. De minimale spuitopening is 0,5mm.
- Om schade aan de nematoden te voorkomen mag de spuitdruk niet hoger liggen dan 20 bar. Het gebruik van zuigerpompen wordt niet aanbevolen.
- Blijf de oplossing omroeren tijdens gebruik.
- Het substraat moet vochtig zijn (bereggen eerst indien nodig) en mag niet uitdrogen tijdens de behandeling, en minstens 2 weken erna.
- Tijdens behandeling en minstens 2 weken erna, moet de temperatuur van het substraat tussen 14°C (57 °F) en 30°C (86 °F) liggen. Temperaturen buiten dit bereik kunnen de effectiviteit verminderen.
- Gebruik tijdens de toepassing voldoende water om irrigatie achteraf te beperken. Indien toegepast op het gebladerte, meteen gieten met water.
- Gebruik niet op zware kleibodems en waterzieke of bevroren gronden.
- Vermijd direct zonlicht. Behandeling moet 's avonds of bij bewolkte weersomstandigheden plaatsvinden (dit vermindert het risico op uitdroging; er is minder UV-licht aanwezig).
- Nooit toepassen via irrigatie!

VERWIJDERING

Het product en de verpakking kunnen, na gebruik, bij niet-gebruik of wanneer het product vervallen is, ter plaatse worden weggegooid of naar een erkend afvalcenter worden gebracht, in overeenstemming met de regionale en nationale voorschriften.

COMPATIBILITEIT MET CHEMISCHE BESTRIJDINGSMIDDELEN

Deze nematoden ondervinden weinig tot geen hinder van de meeste chemische bestrijdingsmiddelen (uitgezonderd nematociden). Controleer voor alle zekerheid onze neveneffectenlijst op www.biobestgroup.com of contacteer uw Biobest-adviseur voor meer informatie.