

Actueel WG van het middel Sumifly OD, 16820 N

26 februari 2025

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.2 Ctgb juni 2019) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per Toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal Aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Tomaat (bedekte teelt)	Wittevlieg ¹ Trips ²	0,125-0,25% (125-250 ml per 100 L water)	2,5 l/ha	4 per 12 maanden	5
Paprika (bedekte teelt)	Wittevlieg ¹ Trips ²	0,125-0,25% (125-250 ml per 100 L water)	2,5 l/ha	4 per 12 maanden	5
Courgette (bedekte teelt)	Wittevlieg ¹	0,125-0,25% (125-250 ml per 100 L water)	2,5 l/ha	4 per 12 maanden	5
Meloen (bedekte teelt)	Wittevlieg ¹	0,125-0,25% (125-250 ml per 100 L water)	2,5 l/ha	4 per 12 maanden	5

*Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Wittevlieg (*Trialeurodes vaporariorum*)

² Trips (*Frankliniella occidentalis*)

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing/en geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per Toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal Aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Aubergine (bedekte teelt)	Wittevlieg ¹ Trips ²	0,125-0,25% (125-250 ml per 100 L water)	2,5 l/ha	4 per 12 maanden	5
Augurk (bedekte teelt)	Wittevlieg ¹	0,125-0,25% (125-250 ml per 100 L water)	2,5 l/ha	4 per 12 maanden	5
Komkommer (bedekte teelt)	Wittevlieg ¹	0,125-0,25% (125-250 ml per 100 L water)	2,5 l/ha	4 per 12 maanden	5
Pompoen (bedekte teelt)	Wittevlieg ¹	0,125-0,25% (125-250 ml per 100 L water)	2,5 l/ha	4 per 12 maanden	5
Stokslaboon (bedekte teelt)	Wittevlieg ¹	0,125-0,25% (125-250 ml per 100 L water)	2,5 l/ha	4 per 12 maanden	5
Linzen (bedekte teelt)	Wittevlieg ¹	0,125-0,25% (125-250 ml per 100 L water)	2,5 l/ha	4 per 12 maanden	5
Vaste plantenteelt (bedekte teelt)	Wittevlieg ¹	0,125-0,25% (125-250 ml per 100 L water)	2,5 l/ha	4 per 12 maanden	5

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken

¹ Wittevlieg (*Trialeurodes vaporariorum*)

² Trips (*Frankliniella occidentalis*)

Overige toepassingsvoorwaarden

Bereid voldoende spuitmengsel voor om een volledige dekking van de teelt te garanderen.

Het middel toepassen in 500-1000 L water/ha. Het middel niet toepassen in walk-in tunnels.

Let op: In het algemeen kan dit product niet worden gemengd in een tank met fungiciden. Voordat u NOFLY OD mengt met een ander gewasbeschermingsmiddel, moet u contact opnemen met de technische afdeling van de distributeur om te weten te komen welke actieve ingrediënten compatibel zijn en wat de juiste doseringen zijn.

Het middel schudden voor gebruik.

De spuitvloeistof roeren tijdens toepassing.

Bevat *Paecilomyces fumosoroseus* strain FE9901: Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor bestuivers en natuurlijke vijanden in kasteelten. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van bestuivers en natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van bestuivers en natuurlijke vijanden en over de in acht te nemen wachttijden.

Let op: de werking van dit product is alleen onderbouwd voor een gewashoogte tot 1,5-2 meter.