

Nieuwsgierig naar uiteenlopende onderwerpen met betrekking tot hygiëne bij gezelschapsdieren? Of geïnteresseerd in actuele informatie op het gebied van gezondheid bij honden of katten? Middels deze nieuwsbrief ontvangt u maandelijks een update over wat er speelt in deze sectoren en hoe Biosecurity BV. hierop inspeelt. Door het ontvangen van deze nieuwsbrief heeft u als eerste toegang tot BiosecurityNieuws en blijft u altijd op de hoogte van onze acties.



In deze editie van BiosecurityNieuws:

- **28 september** Internationale Dag van het Konijn
- Een konijn met buikpijn; welke darmproblemen kunnen konijnen ondervinden?
- Hygiënemaatregelen ter preventie van VHS en Myxomatose

Internationale Dag van het Konijn

Zaterdag 28 september is het de Internationale Dag van het Konijn. Deze dag is speciaal in het leven geroepen om meer bewustzijn te creëren omtrent het houden en verzorgen van konijnen. Wist je bijvoorbeeld dat konijnen groepsdieren zijn en daarom ook zeer ongelukkig zijn wanneer ze alleen zijn? Op de Dag van het Konijn draait het dan ook om het welzijn, bescherming en verzorging van tamme en wilde konijnen. Deze editie van BiosecurityNieuws zal daarom volledig in het teken staan van de gezondheid en hygiëne bij (het houden van) konijnen.

Een konijn met buikpijn

Net als ieder dier, kunnen konijnen last hebben van diarree. Echter brengt diarree bij konijnen extra risico's met zich mee. Omdat konijnen zeer gevoelige darmen hebben, kan diarree al snel levensbedreigend worden. Snel achterhalen waar de diarree vandaan komt is dan ook essentieel. Diarree bij konijnen kan veroorzaakt worden door verschillende factoren:

Diarree als gevolg van verkeerde voeding - Een mogelijke oorzaak van diarree als gevolg van verkeerde voeding is een dieet wat bestaat uit teveel koolhydraten (bijvoorbeeld gemengd voer/brokjes of brood) in combinatie met te weinig hooi. Ook bepaalde groenten kunnen diarree veroorzaken. Let bijvoorbeeld op met de hoeveelheid wortels die je je konijn voert. Wortels bevatten namelijk erg veel suiker en daar kan je konijn door aan de diarree raken.

Diarree als gevolg van coccidiose - Coccidiën zijn parasieten die zich bevinden in het darmstelsel van konijnen en de oorzaak zijn van coccidiose. Coccidiose tast het darmkanaal aan wat resulteert in diarree. Het konijn droogt als gevolg van coccidiose snel uit, verliest gewicht, wordt lusteloos en wil niet meer eten en/of drinken. Bij chronische infecties is de vermagering het meest opvallend.

Voor meer oorzaken van diarree bij konijnen, [klik hier](#)

Risico van diarree bij konijnen - Diarree brengt grote gezondheidsrisico's met zich mee. Vooral jonge konijnen drogen hierdoor snel uit. Verdunde ontlasting is vaak een signaal dat het dier verkeerde voedingsstoffen binnenkrijgt. Zo lang het dier niet ziek is, is het veelal voldoende het dier een paar dagen alleen hooi en water te geven. Gaat de diarree niet over, of vertoont het konijn naast de verdunde ontlasting toch andere signalen, raadpleeg dan snel een dierenarts.

Maatregelen - Wanneer uw konijn last heeft van diarree is het dus van groot belang om de oorzaak te achterhalen om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Echter enkel de oorzaak aanpakken lijkt niet altijd direct de oplossing. Het duurt namelijk even voordat de bacteriële flora van de darmen weer volledig zijn hersteld. Om de balans van de darmflora te ondersteunen is goede nazorg essentieel. ZooLac Propaste® stabiliseert de spijsvertering en balanceert de bacteriële darmflora door gebruik te maken van de goede bacteriën en het eigen immuunsysteem van het dier. Doordat de darmflora sneller hersteld wordt zal ook uw konijn sneller van de diarree verlost zijn.

Voor meer informatie over Zoolac Propaste®, [klik hier](#).
Voor het uitgebreide artikel, [klik hier](#)

Preventieve hygiënemaatregelen VHS/Myxomatose

Het Viraal hemorragisch syndroom (afgekort VHS) en het Myxomatose-virus zijn beide ernstige, vaak dodelijke ziekten bij konijnen. VHS wordt veroorzaakt door het *calicivirus* en verspreid zich na besmetting binnen 24 tot 48 uur over het hele lichaam. VHS kent 2 varianten, het klassieke VHS1-virus en een mutatie op dit virus genaamd VHS type 2. Beide zijn dodelijk voor konijnen.

Myxomatose - Myxomatose is een ernstige, vaak dodelijke ziekte bij konijnen. Het wordt veroorzaakt door een virus dat verwant is aan de pokkenvirussen. Een konijn dat getroffen is door myxomatose krijgt zwellingen bij de ogen, mond en anus. Vervolgens zal het konijn uiteindelijk bijna altijd sterven.

Hygiëne - VHS/Myxomatose kan zowel door direct als indirect contact verspreid worden. Denk bij indirect contact aan contact via ontlasting, handen en kleding. Hygiëne om verspreiding te voorkomen is dus van groot belang. Spoel alle oppervlakken /materialen grondig met water en met een reinigingsmiddel. Naast een goede reiniging is ontsmetting van groot belang. Virkon™S onderscheidt zich van andere ontsmettingsmiddelen doordat het zeer effectief is tegen virussen. Virkon™S is effectief gebleken tegen de virusstam *Caliciviridae*, waar VHS onder valt én tegen *Poxviridae*, waar Myxomatose onder valt.

Voor het uitgebreide artikel, [klik hier](#).

Volg Biosecurity en Zoolac.nl op Social Media



[Klik hier en volg Biosecurity op Facebook](#)

[Klik hier en volg Zoolac op Facebook](#)



[Klik hier en volg Biosecurity op Twitter](#)

[Klik hier en volg Zoolac op Twitter](#)

Voor meer informatie, neem contact op met :



nieuwsbrief@biosecurity.nl

info@zoolac.nl



+31-(0)6 13651010