

FIPROtec®

134 mg spot-on oplossing voor middelgrote honden
Fipronil

**NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL
BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE:**

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Beaphar B.V., Drostenkamp 3, 8101 BX, Raalte, Nederland
T: +31 572 348 834, F: +31 572 348 835, E: hqb@beaphar.com

Fabrikanten verantwoordelijk voor vrijgifte:

Beaphar B.V., Oude Linderteseweg 9, 8102 EV Raalte, Nederland
T: +31 572 348 834, F: +31 572 348 835, E: hqb@beaphar.com

BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

FIPROtec® 134 mg spot-on oplossing voor middelgrote honden (10-20 kg)
Fipronil



GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

1 pipet van 1,34 ml bevat:

Werkzaam bestanddeel:

Fipronil 134,0 mg

Hulpstoffen:

Butylhydroxyanisool (E320) 0,268 mg

Butylhydroxytolueen (E321) 0,134 mg

Benzyl alcohol (E1519) 381,900 mg

Heldere, kleurloze tot gelige oplossing.

INDICATIES

Behandeling en preventie van vlooiënestaties (*Ctenocephalides felis*) bij honden. De beschermingsduur tegen vlooiënestaties is 5 weken.
Het diergeneesmiddel beschermt tegen nieuwe tekeninfestaties (*Dermacentor reticulatus*, *Rhipicephalus sanguineus*) bij honden van dag 7 tot dag 28 na toediening van het diergeneesmiddel. Het diergeneesmiddel heeft geen bewezen effectiviteit bij reeds aanwezige teken.

CONTRA-INDICATIES

Niet gebruiken bij honden jonger dan 8 weken en/of aan honden die minder dan 2 kg wegen.
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen.
Niet gebruiken bij zieke of van ziekte herstellende dieren.
Niet gebruiken bij konijnen, aangezien bijwerkingen en zelfs sterfte kunnen voorkomen.
Dit diergeneesmiddel is specifiek ontwikkeld voor honden. Niet gebruiken bij katten, dit kan leiden tot overdosering.

BIJWERKINGEN

Indien het diergeneesmiddel opgelikt wordt, kan een korte periode van overmatig speeksel worden waargenomen, hoofdzakelijk te wijten aan de aard van de dragerstof. Vermoedelijke bijwerkingen zoals voorbijgaande huidreacties op de toedieningsplaats (huidverkleuring, lokale kaalheid, jeuk, roodheid) en gegeneraliseerde jeuk of kaalheid zijn zeer zelden gemeld na gebruik. Overmatig speeksel, reversibele neurologische symptomen (overgevoeligheid, depressie, nerveuze verschijnselen), braken of respiratoire tekenen zijn zeer zelden na gebruik waargenomen.
Niet overdoseren, dit kan het risico op bijwerkingen vergroten.
Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiting worden vermeld, of u vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

De frequentie van bijwerkingen wordt als volgt gedefinieerd:

- Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 behandelde dieren vertonen bijwerking(en))
- Vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 100 behandelde dieren)
- Soms (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 1.000 behandelde dieren)
- Zelden (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 10.000 behandelde dieren)
- Zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 behandelde dieren, inclusief geïsoleerde rapporten).

DOELDIERSOORT

Hond. Dit diergeneesmiddel is geschikt voor honden met een lichaamsgewicht van 10 tot 20 kg.

DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, TOEDIENINGSWEG EN WIJZE VAN GEBRUIK




Toedieningsweg – Topicale toepassing op de huid.

Dosering: 1 pipet van 1,34 ml per hond van 10 tot 20 kg lichaamsgewicht.

De dosering is 6,7 – 13,4 mg fipronil per kg lichaamsgewicht.

Zorg ervoor dat u het juiste diergeneesmiddel gebruikt, dat overeenkomt met het lichaamsgewicht van uw hond. Alleen voor uitwendig gebruik. De pipet pas uit de originele verpakking halen op het moment van toediening.

AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING



Gebruik de easy-peel hoeken om een pipet uit de blister te halen. Gebruik geen scharen, messen of andere scherpe voorwerpen, omdat hiermee de pipet kan worden beschadigd. Houd de pipet rechtop. Tik zachtjes tegen het nauwe deel van de pipet om alle vloeistof in het dikste gedeelte van de pipet te laten vloeien. Knip het topje van de pipet af met een schaar. Duw de vacht tussen de schouderbladen en de nek opzij totdat de huid zichtbaar wordt. Plaats de punt van de pipet op de huid en knip voorzichtig de helft van de inhoud uit de pipet op beide toedieningsplekken.
Voorkom toediening op de vacht en wrijf het niet in de huid.
Voorkom dat de haren overmatig nat worden na toediening, omdat er dan een kleverige plek kan ontstaan op de toedieningsplaats. Als dit toch zou optreden, zal de plek verdwijnen binnen 24-48 uur na toediening.

In afwezigheid van veiligheidsstudies, dient het diergeneesmiddel niet vaker dan 1 keer per 4 weken toegediend te worden.

WACHTTIJD

Niet van toepassing.

BIJZONDERE BEWAARVOORSCHIFTEN

Direct gebruiken na opening. Niet bewaren boven 25 °C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht. Dit diergeneesmiddel niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het label. De uiterste gebruiksdatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Speciale waarschuwingen voor elke doeldiersoort:

Voor een optimale controle van vlooiënestaties in huishoudens met meerdere dieren dienen alle dieren in het huis behandeld te worden met een geschikt insecticide. Vlooiën van huisdieren bevinden zich vaak ook in de manden, bekleding en de gebruikelijke rustplaatsen, zoals tapijten en gestoffeerd meubilair. Deze dienen dan ook in geval van een massale vlooiënestatie en bij de aanvang van de bestrijdingsmaatregelen behandeld te worden met een geschikt insecticide en door regelmatig stofzuigen.
Er zijn geen gegevens beschikbaar over het effect van baden en wassen met shampoo op de effectiviteit bij honden. Wassen met shampoo voorafgaand of herhaaldelijk ná de behandeling kan van negatieve invloed zijn op hoe goed het diergeneesmiddel werkt. Het diergeneesmiddel voorkomt niet dat teken zich aan het dier hechten. Daarnaast is het niet bekend of het diergeneesmiddel werkzaam is tegen bestaande tekeninfestaties. Hierdoor kan een overdracht van besmettelijke ziektes van de teek op het dier niet uitgesloten worden. Het diergeneesmiddel werkt beschermend tegen nieuwe tekeninfestaties van dag 7 tot dag 28 na toediening van het diergeneesmiddel. Het is echter niet bekend of het nog werkt tegen nieuwe tekeninfestaties indien een periode langer dan 4 weken is verstreken na het moment van toediening. Daarom is de bescherming tegen teken niet sluitend na het opnieuw behandelen, ook al wordt het diergeneesmiddel opnieuw toegediend met het minimum interval van 4 weken.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:

Alleen voor uitwendig gebruik. Gebruik het diergeneesmiddel niet op wonden of beschadigde huid. Vermijd contact met de ogen van het dier. In het geval van accidenteel contact met de ogen, spoel deze dan onmiddellijk grondig met water. Het dier moet vóór behandeling nauwkeurig worden gewogen. Het is belangrijk het diergeneesmiddel aan te brengen op een plaats waar het dier het niet af kan likken. Laat recent behandelde dieren elkaar niet aflikken na behandeling. De potentiële toxiciteit van het diergeneesmiddel voor pups jonger dan 8 weken in contact met een behandelde teef is niet gedocumenteerd. Uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risicobeoordeling door de behandelend dierenarts. Niet gelijktijdig gebruiken met andere vlooiënmiddelen die direct op het dier worden toegepast.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:

Bewaar de pipetten in de originele verpakking tot aan gebruik en verwijder gebruikte pipetten onmiddellijk. Personen met een bekende overgevoeligheid (allergie) voor fipronil of één van de andere hulpstoffen moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden. Vermijd dat de inhoud in contact komt met vingers. Indien dit optreedt, de handen wassen met zeep en water. Dit diergeneesmiddel kan irritatie van de slijmvliezen en ogen veroorzaken, daarom moet contact van het diergeneesmiddel met de mond en ogen worden vermeden. Na accidenteel contact met de ogen dienen de ogen voorzichtig met schoon water te worden gespoeld. Inname van het diergeneesmiddel is schadelijk. Voorkom dat kinderen toegang hebben tot de pipetten en gooi gebruikte pipetten direct na toediening van het diergeneesmiddel weg. In geval van accidentele ingestie, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiting of het etiket te worden getoond. Behandelde dieren moeten niet aangeraakt worden tot de toedieningsplaats droog is. Kinderen moeten niet met de behandelde dieren spelen totdat de toedieningsplaats droog is. Daarom wordt het aanbevolen om dieren niet overdag te behandelen, maar in de vroege avond en om recent behandelde dieren niet te laten slapen bij de eigenaren en in het bijzonder bij kinderen.
Niet roken, drinken of eten tijdens toediening. Handen wassen na gebruik.

Andere voorzorgsmaatregelen:

Fipronil kan waterorganismen nadelig beïnvloeden.
Tot 2 dagen na de behandeling, moeten honden niet gaan zwemmen in oppervlaktewater. Het diergeneesmiddel kan nadelige effecten hebben op geveerde, gelakte oppervlakten of andere oppervlakken in huis of op meubilair.

Belangrijke onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, moet het diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden vermengd.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg:

Niet gebruiken bij drachtige of zogende teven.
Uit laboratoriumonderzoek zijn geen gegevens naar voren gekomen die wijzen op teratogene of foetotoxische effecten. De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen in drachtige of zogende teven, uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risicobeoordeling door de behandelend dierenarts. Wanneer dieren worden behandeld tijdens de lactatieperiode, zie rubriek Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antitoda):

Er zijn geen bijwerkingen aangetoond in tolerantie studies, uitgevoerd met puppy's van 8 weken, opgroeiende honden en honden die ongeveer 2 kg wegen, die eenmalig zijn behandeld met 5 keer de aanbevolen dosis. Het risico van bijwerkingen kan echter toenemen bij overdosering. Daarom wordt aangeraden het dier altijd met de bijbehorende pipetgrootte te behandelen.

SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUEEL AFVALMATERIAAL

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.
Het diergeneesmiddel dient niet in het oppervlaktewater terecht te komen, aangezien dit gevaarlijk kan zijn voor vissen en andere waterorganismen.

DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

20 juni 2019

OVERIGE INFORMATIE

1, 2, 3, 4, 6 pipetten in een kartonnen doos.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

REG NL 113427 - VRIJ

beaphar®

FIPROtec®

134 mg solution spot-on pour chiens
de taille moyenne (10-20 kg)
Fipronil

NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché :
Beaphar B.V., Drostenkamp 3, 8101 BX Raalte, Pays-Bas,
T: +31 572 348 834, F: +31 572 348 835, E: hqb@beaphar.com
Fabricant responsable de la libération des lots :
Beaphar B.V., Oude Linderteseweg 9, 8102 EV Raalte, Pays-Bas,
T: +31 572 348 834, F: +31 572 348 835, E: hqb@beaphar.com

DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRIINAIRE

FIPROtec® 134 mg solution spot-on pour chiens de taille moyenne (10-20 kg)
Fipronil



LISTE DE LA SUBSTANCE ACTIVE ET AUTRES INGRÉDIENTS

1 pipette de 1,34 ml contient :

Substance active :

Fipronil 134,0 mg

Excipients :

Butylhydroxyanisole (E320) 0,268 mg

Butylhydroxytoluène (E321) 0,134 mg

Alcool benzylique (E1519) 381,900 mg

Solution transparente, incolore à légèrement jaune.

INDICATIONS

Chez les chiens pesant de 10 kg à 20 kg :

- Traitement et prévention des infestations par les puces (*Ctenocephalides felis*).
La durée de la protection contre les infestations par les puces est de 5 semaines.
- Le produit protège les chiens contre des nouvelles infestations par les tiques (*Dermacentor reticulatus*, *Rhipicephalus sanguineus*) du 7ème au 28ème jour après l'application du produit. Il n'a pas été montré que le produit est efficace lorsque les tiques sont déjà présentes.

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser chez les chiens âgés de moins de 8 semaines et/ou pesant moins de 2 kg.
Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients.
Ne pas utiliser chez un animal malade ou convalescent.
Ne pas utiliser chez les lapins car des effets indésirables, parfois létaux, pourraient survenir.
Ce produit est spécialement conçu pour les chiens. Ne pas utiliser chez les chats, car cela pourrait conduire à un surdosage.

EFFETS INDÉSIRABLES

Si l'animal se lèche, une brève période d'hypersalivation peut se produire, due principalement à la nature de l'excipient.

Des effets indésirables suspectés tels que des réactions cutanées transitoires sur la zone d'application (décoloration de la peau, alopecie locale, prurit, érythème) et des cas de prurit ou d'alopecie généralisés, ont été rapportés dans de très rares cas après l'utilisation du produit. Une hypersalivation, des symptômes neurologiques réversibles (hyperesthésie, dépression, symptômes nerveux), des vomissements ou des symptômes respiratoires, ont été observés très rarement après utilisation. Ne pas surdoser. Le risque d'effets indésirables peut augmenter en cas de surdosage. Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n'a pas été efficace, veuillez en informer votre vétérinaire.


Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n'a pas été efficace, veuillez en informer votre vétérinaire. La fréquence des effets indésirables est définie comme suit :

- très fréquent (effets indésirables chez plus d'1 animal sur 10 animaux traités)
- fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 100 animaux traités)
- peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1 000 animaux traités)
- rare (entre 1 et 10 animaux sur 10 000 animaux traités)
- très rare (moins d'un animal sur 10 000 animaux traités, y compris les cas isolés)

ESPÈCES CIBLES

Chiens (pesant de 10 à 20 kg).

POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE ET MODE D'ADMINISTRATION




Voie d'administration : Par application topique sur la peau.

Posologie : 1 pipette de 1,34 ml par chien pesant plus de 10 kg et jusqu'à 20 kg. La posologie est de 6,7 à 13,4 mg de Fipronil par kg de poids corporel. Veuillez à utiliser le produit adéquat, correspondant au poids de votre chien.

Voie externe uniquement.

Garder les pipettes dans l'emballage d'origine jusqu'à leur utilisation.

CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE



Utiliser les coins faciles à décoller (« easy-peel ») pour sortir la pipette de sa plaquette. Ne pas ponctionner le film à l'aide de ciseaux, d'un couteau ou de tout autre instrument pointu car ceci peut endommager la pipette à l'intérieur.

Tenir la pipette verticalement. Tapoter la partie étroite de la pipette pour s'assurer que le contenu se trouve dans la partie principale de la pipette. Couper l'embout de la pipette avec des ciseaux.

Écarter les poils de la zone située entre les omoplates et à la base de la tête pour que la

peau soit visible. Placer l'embout de la pipette sur la peau et appuyer doucement afin de vider la moitié de son contenu sur la peau des 2 zones d'application. Éviter d'appliquer la solution sur le pelage et ne pas frotter la peau.

Des précautions particulières doivent être prises afin d'éviter une humidification excessive des poils avec le produit, à l'origine d'un aspect collant des poils sur la zone traitée. Toutefois, si cela se produit, cet aspect disparaîtra dans les 24 à 48 heures suivant l'application. En l'absence d'études d'innocuité, l'intervalle minimum de traitement est de 4 semaines.

TEMPS D'ATTENTE

Sans objet.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Utiliser immédiatement après première ouverture de la plaquette. À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

Garder la pipette dans la plaquette et la boîte jusqu'à son utilisation de façon à la protéger de la lumière. Tenir hors de la vue et de la portée des enfants. Ne pas utiliser ce médicament vétérinaire après la date de péremption figurant sur l'étiquette. La date de péremption correspond au dernier jour du mois indiqué.

MISES EN GARDE PARTICULIÈRES

Précautions particulières pour chaque espèce cible :

Pour contrôler les infestations par les puces de manière optimale dans les foyers où vivent plusieurs animaux, tous les animaux du foyer doivent être traités avec un insecticide approprié. Les puces des animaux de compagnie infestent souvent leur panier, leur lieu de couchage et leurs zones de repos habituelles tels que les tapis et tissus d'ameublement. En cas d'infestation massive, et dès le début des mesures de lutte contre les parasites, ces endroits devront être passés à l'aspirateur régulièrement et traités avec un insecticide adapté. Aucune donnée n'est disponible sur l'effet des bains/shampoings sur l'efficacité du produit chez les chiens. Un shampoing effectué avant ou après le traitement de façon répétée peut réduire la façon dont le produit fonctionne.

Le produit n'empêche pas les tiques de s'attacher à l'animal. De plus, l'efficacité contre les tiques déjà existantes n'a pas été démontrée. Pour cette raison, la transmission de maladies infectieuses ne peut pas être exclue.

Le produit protège les chiens des nouvelles infestations de tiques du 7ème au 28ème jour après l'application. Néanmoins, l'efficacité contre une infestation de tiques au-delà de 4 semaines n'est pas connue. En conséquence, il peut y avoir une interruption dans la protection contre une telle infestation suite à une nouvelle application du produit, même si le produit est appliqué de nouveau dans l'intervalle minimum de 4 semaines.

Précautions particulières d'utilisation chez l'animal :

Voie externe uniquement.

Ne pas appliquer le produit sur des plaies ou des lésions cutanées. Éviter tout contact avec les yeux de l'animal. En cas de contact accidentel avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau.

Les animaux doivent être pesés avec précision avant le traitement.

Il est important de s'assurer que le produit est appliqué sur une zone où l'animal ne peut pas se lécher et de s'assurer que les animaux ne se lèchent pas entre eux après le traitement. Des études spécifiques sur l'innocuité du produit chez des chiots de moins de 8 semaines en contact avec une chienne traitée n'ont pas été menées. Dans ce cas le produit ne doit être utilisé qu'après évaluation du rapport bénéfice/risque établie par le vétérinaire responsable. Ne pas utiliser simultanément avec d'autres produits anti-puces qui sont appliqués directement sur l'animal.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux :

Garder les pipettes dans leur emballage d'origine jusqu'à leur utilisation et jeter immédiatement après. Les personnes présentant une hypersensibilité (allergie) connue au fipronil ou aux excipients doivent éviter tout contact avec le médicament vétérinaire. Éviter le contact du produit avec les doigts. Si cela se produit, se laver les mains avec de l'eau et du savon.

Ce produit peut irriter les muqueuses et les yeux. En conséquence, éviter le contact du produit avec la bouche et les yeux.

En cas de contact accidentel avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau. L'ingestion du produit est nocive. Empêcher les enfants d'avoir accès aux pipettes et jeter la pipette utilisée immédiatement après l'application du produit. En cas d'ingestion accidentelle, demandez immédiatement conseil à un médecin et montrez-lui la notice ou l'étiquette.

Tant que la zone d'application n'est pas sèche, les animaux traités ne doivent pas être manipulés et les enfants ne doivent pas être autorisés à jouer avec les animaux traités. Il est donc recommandé de ne pas traiter les animaux pendant la journée mais plutôt en début de soirée, et de ne pas laisser les animaux qui viennent d'être traités dormir avec leurs maîtres, surtout avec les enfants.

Ne pas fumer, boire ou manger durant l'application.

Se laver les mains après utilisation.

Autres précautions :

Le fipronil peut être dangereux pour les organismes aquatiques.

Ne pas laisser les chiens nager dans des cours d'eau pendant les 2 jours suivant l'application. Le produit peut altérer les surfaces peintes, vernies ou d'autres plans de travail ou, le mobilier.

Incompatibilités majeures :

En l'absence d'études de compatibilité, ce médicament vétérinaire ne doit pas être mélangé avec d'autres médicaments vétérinaires.

Gestation et lactation :

Ne pas utiliser sur des chiennes gestantes ou lorsque la chienne donne son lait aux chiots. Les études de laboratoire sur le fipronil n'ont pas mis en évidence d'effets tératogènes ou embryotoxiques. L'innocuité du produit n'a pas été évaluée chez les chiennes gestantes ou allaitantes. L'utilisation du médicament en cas de gestation et d'allaitement ne doit se faire qu'après évaluation du rapport bénéfice/risque établie par un vétérinaire responsable. Pour les animaux traités pendant la lactation, voir la rubrique « Précautions particulières d'emploi chez les animaux ».

Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes) :

Aucun effet indésirable n'a été mis en évidence dans les études de tolérance chez les chiots âgés de 8 semaines, les chiens en phase de croissance et les chiens d'environ 2 kg traités de 1 à 5 fois la dose recommandée.

Le risque d'effets indésirables peut toutefois augmenter en cas de surdosage, ce qui signifie que les animaux doivent toujours être traités avec une pipette correspondant à leur taille et à leur poids.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRIAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS

Tout médicament vétérinaire non utilisé ou déchet dérivé de ce médicament doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur. Le produit peut avoir un effet nocif sur les organismes aquatiques. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les égouts avec le produit ou les conditionnements vides.

DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE

03/05/2019.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

1, 2, 3, 4, 6 pipettes sont emballées dans une boîte en carton. Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.