

Reisfit, 40 mg tablet voor honden en katten

**NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER
VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT
VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN
VERSCHILLEND**

Beaphar B.V.
Drostenkamp 3
8101 BX Raalte

BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Reisfit, 40 mg tablet voor honden en katten
Cyclizinehydrochloride

**GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE
BESTANDDELEN**

Per tablet:

Werkzaam bestanddeel:
Cyclizinehydrochloride 40mg

INDICATIE

Preventie van reisziekte.

CONTRA-INDICATIES

Niet gebruiken bij dieren met epilepsie.

BIJWERKINGEN

- Sedatie
- Coördinatiestoornissen
- Xerostomie (droge mond)

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

DOELDIERSOORTEN

Hond en kat

**DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT,
TOEDIENINGSWEG EN WIJZE VAN GEBRUIK.**

Toedieningsweg: Oraal

Dosering: 4 mg cyclizinehydrochloride per kg lichaamsgewicht (= 1 tablet per 10 kg lichaamsgewicht), een half uur voor het transport toedienen, de behandeling zonodig om de 6 uur herhalen met een maximum van 3 maal daags.

WACHTTIJD

Niet van toepassing.

BIJZONDERE BEWAARVOORSCHIFTEN

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Niet in de koelkast of vriezer bewaren. Beschermen tegen vocht. Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren. Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket.

SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is:

Niet toedienen aan zeer jonge of zwakke dieren.
Niet toedienen aan honden en katten lichter dan 2,5 kg.

Gebruik tijdens dracht of lactatie:

Niet gebruiken tijdens de dracht of lactatie.

Overdosering (symptomen, procedures in nood-gevallen, antidota), indien noodzakelijk

De tolerantiegrens van cyclizine ligt circa 3 maal zo hoog als de therapeutische dosis. Bij verzwakte dieren kan de tolerantiegrens lager liggen. Overdosering kan bij honden en katten leiden tot evenwichtsstoornissen en een soort epileptische aanvallen. De dierenarts moet symptomatisch behandelen.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIETGEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUEEL AFVALMATERIAAL

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

11 juli 2017

OVERIGE INFORMATIE

REG NL 3477

KANALISATIE

VRIJ

Distributie:
Beaphar Nederland BV
Hedel

334908-A

Reisfit

| Preventie van
reisziekte



**Helpt tegen wagen-,
lucht- en zeeziekte**

**vanaf
2,5 kg**