

	BRMO (A)	MRSA (B)	BRMO MRSA (C)
<i>kolom</i>			
standaard diagnostiek¹⁾			
uitstrijk keel en (peri-)anaal	<input type="checkbox"/>		
uitstrijk keel, neus en (peri-)anaal		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
huiddefecten²⁾			
uitstrijk oppervlakkige wond	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
locatie:			
uitstrijk diepe wond	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
locatie:			
additionele diagnostiek³⁾			
urine (<i>katheter in situ of eerder positief</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sputum (<i>luchtweginfectie of eerder positief</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Instructie afname, vermeld op alle materialen naam patiënt, geboortedatum en locatie afname.

¹⁾ gebruik voor iedere locatie een nieuwe swab

keelkweek: maak met één swab een uitstrijk van beide keelbogen links en rechts

neuskweek: maak met één swab, d.m.v. een rollende beweging over het neusslijmvlies, een uitstrijk van beide neusgaten

(peri-)anaal kweek: maak met één swab, d.m.v. een rollende beweging, een uitstrijk van de huid direct rond de anus (voor BRMO anaal)

²⁾ strijk of rol met één swab over het huiddefect (wond of eczeem), bij grote (open)wonden het kweekmateriaal uit de diepte van de wond afnemen

³⁾ urine en sputum op dezelfde wijze en met dezelfde materialen afnemen en versturen zoals u gewend bent

Van keel, neus en (peri-)anaal worden kweken afgenomen. Als de patiënt wonden en/of eczeem heeft, worden ook deze plaatsen gekweekt, alsook exit sites van drains en/of externe fixateurs. Is er tevens sprake van een urinekatheter, urineweg- en/of luchtweginfectie dan dient er ook een urine en/of sputum voor kweek te worden ingestuurd.

BRMO/MRSA inventarisatiekweken zijn nodig in de volgende gevallen.

Buitenlandse zorginstelling

- Patiënt verbleef in de afgelopen 2 maanden langer dan 24 uur in een buitenlandse zorginstelling.

- Patiënt heeft risicofactoren als een persisterende huidleesie, een drain, een katheter, een fixateur, een chronische lucht- of urineweginfectie aansluitend aan opname in een buitenlandse zorginstelling ongeacht de opnameduur en tijd in het verleden.

Contact met positieve BRMO of MRSA persoon/personen

- Patiënt verbleef in de afgelopen 2 maanden in een andere NL zorginstelling op een afdeling waar een BRMO of MRSA-epidemie heerst(e).

- Patiënt heeft partners of huisgenoten met BRMO of MRSA.

- Patiënt is verzorgende van BRMO of MRSA positieve persoon/personen en heeft deze zonder isolatiemaatregelen verpleegd.

Dialysepatiënten

- Buitenlandse gastdialysant die gedialyseerd gaat worden op een dialyseafdeling in NL.

- Dialysant die de afgelopen 2 maanden is gehaemodialyseerd in een buitenlandse zorginstelling.

Adoptie

- Patiënt is geadopteerd uit het buitenland en korter dan één jaar in Nederland (overleg met arts-microbioloog gewenst).

Recent verblijf in asielzoekerscentrum

- Patiënt verbleef in de afgelopen 2 maanden in een asielzoekerscentrum.

- Patiënt werkte in de afgelopen 2 maanden in een asielzoekerscentrum en heeft zorgcontact.

Contact cq. wonend op bedrijf levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens

- Patiënt had minder dan 2 maanden geleden beroepsmatig contact met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens.

Patiënt in behandeling voor dekolonisatie MRSA

- Behandeling loopt nog of er zijn nog geen drie opeenvolgende negatieve kweken op MRSA met tussenpozen van 5 dagen.

Ziekenhuisopname.

Als de patiënt voor opname in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis of de St. Maartenskliniek een afspraak heeft, dan heeft het de voorkeur de inventarisatiekweken in de huisartsenpraktijk te laten afnemen minimaal één week voor de afspraak. Is uitstel medisch onverantwoord, dan verzoeken wij u bij de doorverwijzing aan de desbetreffende afdeling te laten weten dat de patiënt voldoet aan een of meerdere van de bovengenoemde criteria.

Indien de uitslagen van de kweken negatief zijn (betreft dit een dekolonisatie dan mag de patiënt nog niet als negatief worden gezien), kan de afspraak zonder verdere voorzorgsmaatregelen plaatsvinden. Is de patiënt BRMO of MRSA positief dan zullen er tijdens de afspraak/opname extra voorzorgsmaatregelen getroffen worden.

Voor meer informatie unit infectiepreventie CWZ 024-366 81 67

Materiaal inleveren/bloedafname

grijze envelop: direct op de post (CWZ MMB C70, antwoordnummer 2203, 6500 WC Nijmegen) of afgeven bij een van de afgiftepunten

rode envelop: inleveren nog dezelfde dag bij de aanvrager van de diagnostiek of afgeven bij een van de afgiftepunten

afgiftepunten:

- ▶ CWZ hoofdgebouw, Weg door Jonkerbos 100, 6532 SZ Nijmegen, 024-365 76 57

- poli bloedafname B82

- medische microbiologie C70 (buiten openingstijden in brievenbus bij afgifteloket)

- ▶ CWZ polikliniek Jonkerbosch, Burgemeester Daleslaan 27, 6532 CL Nijmegen, 024-365 76 57

- ▶ CWZ Waalsprong, Carbatinastraat 3, 6515 GM Nijmegen, 024-365 70 80

- ▶ CWZ Druten, Kerkenland 3, 6651 KN Druten, 024-365 75 90 (tot uiterlijk 11:00 uur)

- ▶ CWZ prikposten (overzicht actuele prikposten en openingstijden www.cwz.nl)

Als verzending niet direct mogelijk is moet de envelop tot aan verzending in de koelkast bewaard worden. Het monster dient binnen 24-48 uur na afname op het laboratorium aanwezig te zijn.